



Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku okresem letnim oraz trwającymi, intensywnymi pracami polowymi, przypominamy o bardzo wysokim ryzyku transmisji wirusa ASF ze środowiska naturalnego do gospodarstw utrzymujących świnię. Aktualnie, stwierdzone zostały trzy ogniska ASF u świń w kraju, a ostatnie w dniu 22 lipca 2026 r.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że na terenie sąsiedniego województwa – świętokrzyskiego nieustannie występują nowe ogniska tej choroby u dzików. Dane te świadczą o tym, że wirus ASF w środowisku jest cały czas obecny i stanowi istotne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej.

Niekorzystna sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do ASF występuje również innych w krajach UE (ogniska ASF u świń w bieżącym roku potwierdzono między innymi na Słowacji, Węgrzech i Chorwacji). Afrykański pomór świń to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%. Kraje dotknięte ASF narażone są na bardzo duże straty ekonomiczne (upadki zwierząt, koszty likwidacji ognisk, ograniczenia obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń).

Strefa wolna nie chroni powiatu mieleckiego przed ASF. Wobec powyższego apeluje się do wszystkich hodowców świń o przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji.

Poniżej kluczowe elementy bioasekuracji:

- 1) Zwierzęta wprowadzane do stada muszą pochodzić z legalnego, wiadomego źródła, a więc muszą być oznakowane oraz zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny.
- 2) Budynki, w których utrzymywane są świnię muszą być szczelne, zabezpieczone przed dostępem zwierząt domowych i dzikich.
- 3) Pasza do karmienia świń oraz ściółka muszą być zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt.
- 4) Należy zapewnić czystość i higienę w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnię.
- 5) Przed wejściami i wyjściami do tych pomieszczeń należy stosować urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję lub wyłożyć maty dezynfekcyjne.
- 6) Do gospodarstwa nie mogą być wprowadzane sprzęty ani narzędzia używane w innych gospodarstwach.
- 7) Personel obsługujący zwierzęta musi przestrzegać zasad higieny oraz stosować odzież i obuwie przeznaczone do obsługi zwierząt, a szczególną ostrożność należy zachować po wykonywaniu prac polowych i leśnych, przed ponownym kontaktem ze świnię.
- 8) Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu wchodzenia osób postronnych na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnię.



Główny Inspektorat
Weterynarii

ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność



Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.

Objawy kliniczne ASF:

nagle padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (często z domieszką krwi), wymioty, ronienia u macior prośnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.





§

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń

PAMIĘTAJ !!!

utrzymuj świnie w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach

zabezpieczaj budynek przed dostępem
innych zwierząt

przed wejściami i wyjściami do i z
pomieszczeń używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
lub wyłóż maty dezynfekcyjne

przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem
i wyjazdem z gospodarstwa oraz
wybiegu używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
(niecki dezynfekcyjne lub maty
dezynfekcyjne)

karm świnie paszą zabezpieczoną przed
dostępem innych zwierząt

myj i odkażaj ręce oraz obuwie

używaj dedykowanej do prac tylko przy
świniach odzieży oraz obuwia roboczego

myj i odkażaj narzędzia oraz sprzęt do
obsługi świń minimum raz dziennie

zwalczaj gryzonie

STOSUJ ZAKAZY !!!

karmienia świń zielonką lub ziarnem
pochodzącym z obszarów objętych
ograniczeniami II, III (chyba że zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 30 dni)

wykorzystywania słomy na ściótkę
pochodzącej z obszarów objętych
ograniczeniami II i III (chyba że zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 90 dni)

obsługi świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 48 godzin uczestniczyły w
polowaniu lub odłowię zwierząt łownych

wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, zwłok, tusz, części tusz,
produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego pochodzących z dzików oraz
materiałów i przedmiotów, które mogły
zostać skażone wirusem ASF

wchodzenia osobom postronnym do
budynków, w których są utrzymywane
świnie

pożyczania sprzętu do obsługi świń do
innych gospodarstw