



Afrykański pomór świń

W związku z utrzymującym się wysokim ryzykiem transmisji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) ze środowiska naturalnego do gospodarstw przypominam o konieczności bezwzględного przestrzegania zasad bioasekuracji. W kraju potwierdzono 10 ognisk ASF u świń, w tym trzy we wrześniu 2026 r. Niepokojąca sytuacja epidemiologiczna występuje również wśród dzików, m.in. w województwach świętokrzyskim i podkarpackim. Zagrożenie utrzymuje się także w innych krajach UE. ASF jest groźną chorobą wirusową, która może powodować śmiertelność zwierząt sięgającą 100%, a także poważne straty ekonomiczne związane z likwidacją ognisk choroby i ograniczeniami w handlu. Przebywanie powiatu mieleckiego w strefie wolnej od ASF nie oznacza braku zagrożenia. Apeluję zatem do wszystkich hodowców świń o zachowanie szczególnej ostrożności i konsekwentne stosowanie zasad bioasekuracji w celu ochrony gospodarstw przed zawleczeniem wirusa.



Główny Inspektorat
Weterynarii



ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność

Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.

Objawy kliniczne ASF:
nagle padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (często z domieszką krwi), wymioty, ronienia u macior prośnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.



@WetGWW



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska



§

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń

PAMIĘTAJ !!!

utrzymuj świnie w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach

zabezpieczaj budynek przed dostępem
innych zwierząt

przed wejściami i wyjściami do i z
pomieszczeń używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
lub wyłóż maty dezynfekcyjne

przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem
i wyjazdem z gospodarstwa oraz
wybiegu używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
(niecki dezynfekcyjne lub maty
dezynfekcyjne)

karm świnie paszą zabezpieczoną przed
dostępem innych zwierząt

myj i odkażaj ręce oraz obuwie

używaj dedykowanej do prac tylko przy
świniać odzieży oraz obuwia roboczego

myj i odkażaj narzędzia oraz sprzęt do
obsługi świń minimum raz dziennie

zwalczaj gryzonie

STOSUJ ZAKAZY !!!

karmienia świń zielonką lub ziarnem
pochodzącym z obszarów objętych
ograniczeniami II, III (chyba że zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 30 dni)

wykorzystywania słomy na ściótkę
pochodzącej z obszarów objętych
ograniczeniami II i III (chyba że zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 90 dni)

obsługi świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 48 godzin uczestniczyły w
polowaniu lub odłowię zwierząt łownych

wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, zwłok, tusz, części tusz,
produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego pochodzących z dzików oraz
materiałów i przedmiotów, które mogły
zostać skażone wirusem ASF

wchodzenia osobom postronnym do
budynków, w których są utrzymywane
świnie

pożyczania sprzętu do obsługi świń do
innych gospodarstw